

医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

名称	小児用新オムニンA
----	-----------

第②類 医薬品

成分・分量	<p>30mL(1瓶)中 アセトアミノフェン 300mg, クロルフェニラミンマ レイン酸塩 2.5mg, 臭化水素酸デキストロメト ルファン 15mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg, グアヤコールスルホン酸カリウム 80mg, 無水カ フェイン 50mg,</p> <p>添加物として、クエン酸Na、白糖、D-ソルビト ール、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレ ングリコール、香料を含有しています。</p>
-------	--



用法・用量	<p>下記の1回量を添付の計量コップにとり、1日3回食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。 場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用しても差し支えありません。 3才以上7才未満 5.0mL, 1才以上3才未満 3.7mL, 6か月以上1才未満 3.0mL, 3か月以上6か月未 満 2.5mL,</p>
-------	--

効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
してはいけないこと	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。) 服用前後は飲酒しないでください。 長期連用しないでください。
次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください	<ol style="list-style-type: none"> 医師又は歯科医師の治療を受けている人 妊婦又は妊娠していると思われる人 授乳中の人 高齢者 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 次の症状のある人: 高熱、排尿困難 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
その他	
店名	

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。